

# قرص واژی کلین® Vagiclean® Tablet



- درمان عفونت‌های باکتریایی واژن
- حاوی عصاره مرزنجوش، بادرنجبویه



## Reference:

- 1) Megh Raj Goyal; Hafiz Suleria; Ramasamy Harikrishnan. The role of phytoconstituents in health care: biocompounds in medicinal plants. Palm Bay, Florida, USA: Apple Academic press, 2020:203-204

از دل طبیعت بر مدار دانش

✉ barij\_essence\_co  
✉ barij\_essence  
✉ www.barijessence.com  
✉ SD@barijessence.com

## قرص واژینال واژی کلین®

با داشتن ترکیبیاتی موثر مانند رزمارینیک اسید و فرمولی ویژه از مرزنجوش (Origanum vulgare) و بادرنجبویه (Melissa officinalis)، قرص واژینال واژی کلین® برای درمان واژینوز باکتریال (BV) تجویز می شود تا شبی ۱ عدد داخل واژن استعمال شود. پزشک می تواند بهترین مدت درمان را برای هر بیمار توصیه کند. درصورت وجود حساسیت شناخته شده نسبت به هریک از اجزاء فرآورده، استفاده از آن مجاز نیست. در دوران بارداری و شیردهی؛ لازم است قبل از مصرف، با پزشک و/یا داروساز مشورت شود. استفاده از این فرآورده مطابق دستور مصرف توصیه شده، اینم و فاقد عوارض است. در صورت بروز عوارض با پزشک یا داروساز مشورت شود و اگر علائم غیرمعمول ظاهر شد، مصرف فرآورده باید متوقف شود. تداخلات دارویی احتمالی فرآورده مشخص نیست. اگر هرنوع داروی دیگری مصرف می شود یا اخیراً مصرف شده حتی اگر فرآورده بدون نسخه است، باید به پزشک یا داروساز اطلاع داده شود.

## واژی کلین®

واژینوز باکتریال (Bacterial vaginosis)؛ یک عفونت پلی میکروبیال است که در آن باکتری های بیهوایی رشد بیش از حد داشته و جایگزین لاکتوپاسیل های طبیعی تولید کننده هیدروژن پراکسید میشوند در نتیجه ترشحات واژینال رقيق، یکنواخت، خاکستری و بدبو بوجود می آید. در فلور نرمال واژن، باکتری های بیهوایی کمتر از ۱ درصد است در حالی که در خانم های مبتلا به واژینوز باکتریایی؛ بیهوایی ها و گاردنلا واژینالیس و مایکوپلاسمای هومینیس ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از حالت نرمال است و لاکتوپاسیل ها معمولاً وجود ندارند که در این حالت استقرار مجدد فلور نرمال واژن مشکل و عود واژینوز باکتریایی شایع است. استشمام بوی ماهی از ترشحات (تست Whiff- amine مثبت) و pH بیشتر از ۴/۵ واژن و مشاهده سلول های کلیدی (Clue cells) در زیر میکروسکوپ (بیش از ۲۰ درصد) از خصوصیات آن است. به این نوع عفونت واژن؛ واژینیت غیراختصاصی یا واژینیت گاردنلا واژینالیس هم گفته میشود و شایعترین علت ترشحات واژن در زنان سن باروری است. گاردنلا واژینالیس در ۴۰ تا ۵۰ درصد ترشحات واژن وجود دارد و ممکن است در ایجاد بیوفیلم اپی تلیال اهمیت داشته باشد. ۵۰ تا ۷۵ درصد بیماران بیعلامت هستند. زنان مبتلا به واژینوز باکتریال در خطر افزایش ابتلا به سایر بیماری های منتقله از راه جنسی (STDs) مانند HIV، نایسربا گونوره، کلامیدیا تراکوماتیس و HSV-2 قرار دارند. واژینوز باکتریال ممکن است به ایجاد عفونت HPV کمک کند همچنین با بیماری التهابی لگن (PID) و عوارض بعد از جراحی زنیکولوژیک همراه است. واژینوز باکتریال ممکن است با تولد نوزاد کم وزن، پاره شده زودهنگام پرده ها (PROM) و نارسی همراه باشد. واژینوز باکتریال ممکن است در ۳۰ درصد افراد طی ۳ ماه اول پس از درمان عود کند. مترونیدازول که برای درمان این بیماری مورد استفاده قرار می گیرد با عوارضی مانند تهوع، ایجاد طعم فلزی در دهان، نوروپاتی محیطی و عفونت کاندیدا همراه است.

استفاده از فیتوتراپی در عفونت های واژن سابقه طولانی دارد. برای درمان عفونت های واژن از مرزنجوش (۱) و بادرنجبویه استفاده شده است.